

## Obsah

8 Kritické body	11
9 Hessián, definitnost matic, extrémý	14
Řešení	17



Co byste si měli z tohoto cvičení odnést:

- Co to je kritický bod a jaký je jeho význam pro hledání extrémů.
- Jak pro danou vícerozměrnou funkci najít Hessovu matici (Hessián).
- Jak zjistit, jestli je daný Hessián pozitivně/negativně (semi)definitní nebo indefinitní (Sylvestrovo kritérium),
- a jak nám toto zjištění pomůže k určení povahy kritického bodu: je to maximum/minimum/ani jedno (sedlový bod)?
- Ti zdatnější by měli znát geometrický význam Hessiánu a s jeho pomocí umět vysvětlit, proč z něj můžeme poznat povahu extrému.

A co byste se měli doučit pokud to ještě/už neumíte:


- Řešit soustavu lineárních rovnic a příp. jednodušší nelineární soustavy.
- Spočítat determinant matic o rozměrech  $2 \times 2$  a  $3 \times 3$ .
- Násobit matice a vektory.
- Derivovat!

## 8 Kritické body

**Cvičení 8.1** Uvažujme funkci  $f(x, y) = 2(x^2 + y^2)e^{-x^2 - y^2}$ .

- (a) S pomocí grafu na následujícím obrázku odhadněte, kde jsou lokální/globální maxima/minima, a určete, která z nich jsou ostrá.
- (b) Pomocí geometrického významu gradientu najděte přesné souřadnice těchto bodů.


?



**Cvičení 8.2** Uvažujme funkci  $f(x, y) = x^2 - y^2$ .

- (a) S pomocí grafu na následujícím obrázku odhadněte, v jakých bodech je tečná rovina rovnoběžná s osami  $x$  a  $y$ ?
- (b) Pomocí rovnice tečné roviny najděte přesné souřadnice těchto bodů.

?



**Definice 8.1** Body definičního oboru funkce, kde je gradient dané funkce nulový vektor nebo není definován, se nazývají *kritické body*.

☐ Význam kritických bodů je stejný, jako význam bodů, ve kterých je derivace nulová (či neexistuje) pro jednorozměrné funkce: jsou to body *podezřelé z extrému*. Platí totiž podobně jako v jednorozměrném případě následující věta:

**Věta 8.2** Je-li bod  $b \in \mathbb{R}^n$  lokální extrém funkce  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  a má-li tato funkce v bodě  $b$  parciální derivace, potom jsou tyto parciální derivace nulové (tzn.  $b$  je kritický bod).

**Cvičení 8.3** Najděte všechny kritické body následujících funkcí:

(a)  $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ ,

(b)  $f(x, y, z) = 3x^2 + xy + 3zy$ ,

(c)  $f(x, y) = e^{-x^2 - 7y^2 + 3}$ ,

(d)  $f(x, y) = x^2 + y^2 + 3xy + 10$ ,

(e)  $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ .



#### Cvičení 8.4 Funkce

$$f(x, y) = \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2})}{\pi\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

není definována v bodě  $(0, 0)$ .

- (a) Jak musíme dodefinovat funkční hodnotu  $f(0, 0)$ , aby výsledkem mohla být všude spojitá funkce?
- (b) Jaké jsou kritické body této spojitě funkce?



## 9 Hessián, definitnost matic, extrémů

V případě jednorozměrných funkcí jsme mohli rozhodnout, jestli je daný kritický bod minimum, maximum či inflexní bod pomocí druhé derivace a jejího znaménka. V případě vícerozměrné funkce  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  hraje roli druhé derivace *Hessova matice* (*Hessián*)

$$\nabla^2 f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}.$$

avšak u matice pojem znaménka ztrácí smysl. Přesto (většinou) umíme z této matice určit, jestli se jedná o maximum či minimum: k tomu slouží pojmy pozitivně/negativně (semi)definitní matice.

**Definice 9.1** Matice  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  je



- (i) *pozitivně definitní*, jestliže pro všechny **nenulové** vektory  $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$  platí

$$\vec{a}^T A \vec{a} > 0,$$

- (ii) *pozitivně semidefinitní*, jestliže pro všechny vektory  $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$  platí

$$\vec{a}^T A \vec{a} \geq 0,$$

- (iii) *negativně definitní*, jestliže pro všechny **nenulové** vektory  $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$  platí

$$\vec{a}^T A \vec{a} < 0,$$

- (iv) *negativně semidefinitní*, jestliže pro všechny vektory  $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$  platí

$$\vec{a}^T A \vec{a} \leq 0,$$

- (v) *indefinitní* pokud nenastává ani jeden z výše uvedených případů.

U jednorozměrných funkcí platila pravidla typu: „Je-li druhá derivace v kritickém bodě  $x_0$  kladná, jedná se o minimum a funkce je zde konvexní.“ Ve více rozměrech kladnost a zápornost nahrazuje pozitivní resp. negativní definitnost, jinak pravidla zůstávají analogická.

**Věta 9.2 — Postačující podmínka existence extrému a sedlového bodu.** Necht  $\mathbf{b} \in D_f$  je stacionární bod funkce  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, D_f \subset \mathbb{R}^n$ . Necht existuje okolí  $H(\mathbf{b}) \subset D_f$  takové, že  $f$  má na  $H(\mathbf{b})$  spojitě všechny druhé parciální derivace, potom

- je-li  $\nabla^2 f(\mathbf{b})$  pozitivně definitní, pak  $\mathbf{b}$  je bodem ostrého lokálního minima;
- je-li  $\nabla^2 f(\mathbf{b})$  negativně definitní, pak  $\mathbf{b}$  je bodem ostrého lokálního maxima;
- je-li  $\nabla^2 f(\mathbf{b})$  indefinitní, pak  $\mathbf{b}$  je sedlový bod.

**Geometrický význam Hessiánu:** V předchozím cvičení jsme ukázali, jak lze gradient použít k výpočtu první derivace v bodě  $b$  ve směru daného jednotkového vektoru  $\vec{s}$ : ta se rovnala skalárnímu součinu gradientu v tomto bodě a tohoto vektoru:

$$\nabla f(b) \cdot \vec{s}.$$

Podobně bychom se mohli ptát, jak spočítat druhou derivaci v bodě  $b$  ve směru jednotkového (sloupcového) vektoru  $\vec{s}$ . A odpověď je, že tato derivace se rovná

$$\vec{s}^T \cdot \nabla^2 f(b) \cdot \vec{s},$$

tedy Hessiánu maticově vynásobeným zleva i zprava směrovým vektorem. Pomocí tohoto poznatku můžeme interpretovat pravidlo „Je-li  $\nabla^2 f(b)$  pozitivně definitní, je  $b$  bodem ostrého lokálního minima.“ takto: uděláme-li v daném kritickém bodě řez libovolným směrem a vzniklá jednorozměrná funkce bude mít v tomto bodě druhou derivaci vždy kladnou, jedná se o lokální minimum původní vícerozměrné funkce.

**Základní cvičení 9.1** Uvažme funkce

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$g(x, y) = x^2 - y^2$$

$$h(x, y) = x^2 + y^3$$

$$u(x, y) = xy$$

$$w(x, y) = (x + y)^2$$

$$z(x, y) = x^4 + y^4$$

Pro všechny funkce najděte všechny kritické body a zjistěte, zda se jedná o lokální minimum, lokální maximum nebo sedlový bod. Prof funkce  $f$  a  $g$  spočtěte první a druhou derivaci ve směru přímky  $y = x$  v bodě  $(1, 1)$ .

**Základní cvičení 9.2** Mějme

$$f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z.$$

Najděte všechny kritické body a zjistěte, zda se jedná o lokální minimum, lokální maximum nebo sedlový bod.

**Cvícení 9.3** Najděte Hessián následujících funkcí:

(a)  $f(x, y) = x^2 y^2,$

(b)  $f(x, y) = e^{-(x+y)},$


(c)  $f(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^4.$

**Cvičení 9.4** V bodě  $b$  najděte druhou derivaci funkce  $f$  ve směru vektoru  $\vec{s}$ , kde

(a)  $f(x, y) = x + 2x^2 - 3xy, b = (1, 1)$  a  $\vec{s}^T = (3/5, 4/5)$ ,


(b)  $f(x, y) = \ln(\sqrt{x^2 + y^2}), b = (1, 0)$  a  $\vec{s}^T = (2/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$ ,


(c)  $f(x, y, z) = xyz, b = (1, 1, 1)$  a  $\vec{s}^T = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$ .

 Poznat, jestli je matice pozitivně či negativně (semi)definitní, není jednoduchý úkol. Pomoci nám můžou následující kritéria:

**Věta 9.3** Buď  $M$  *symetrická* matice. Potom platí následující:

- Matice  $M$  je pozitivně definitní právě tehdy, když všechna její vlastní čísla jsou kladná.
- [Sylvestrovo kritérium] Pro matici  $M \in \mathbb{R}^{n,n}$  definujeme matice  $M_1, M_2, \dots, M_n$  takto:  $M_k \in \mathbb{R}^{k,k}$  je čtvercová matice v levém horním rohu matice  $M$ . Platí:
  - Matice  $M$  pozitivně definitní právě tehdy, když je determinant všech matic  $M_1, M_2, \dots, M_n$  kladný.
  - Matice  $M$  negativně definitní právě tehdy, když je determinant matic  $M_k$  záporný pro  $k$  liché a kladný pro  $k$  sudé.

 Všimněte si, že předchozí větu lze použít pouze pro určení definitnosti, nikoli semidefinitnosti!

**Cvičení 9.5** Rozhodněte, pro jaké hodnoty konstant  $A, B, C \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  je bod  $(0, 0)$  pro funkci  $g(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$  bodem lokálního minima resp. lokálního maxima. 


**Cvičení 9.6** Najděte všechny maxima a minima funkce


(a)  $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2 + 16$ ,

(b)  $f(x, y) = 3x^2 - 5xy + 3y^2$ .

**Cvičení 9.7** Najděte lokální maxima, minima a sedlové body funkce

$$f(x, y) = (x^2 - y^2)e^{(-x^2 - y^2)/2}.$$

**Cvičení 9.8** Najděte bod na rovině  $x + 3y - z = 6$ , který je nejbližší počátku  $(0, 0, 0)$ . 

**Cvičení 9.9** Najděte bod na „dvoj-kuželu“  $z^2 = x^2 + y^2$ , který je nejbližší bodu  $(1, 2, 0)$ . 

**Cvičení 9.10** Máme navrhnout tvar krabice (ve tvaru kvádra) bez víka na kočičí žrádlo tak, aby se do ní vešlo  $256 \text{ cm}^3$  zmíněné hmoty a abychom co nejvíce ušetřili na materiálu. Jaké budou rozměry této

krabice? Jaký by byl výsledek, pokud by byla krabice zavřená i shora?



**Cvičení 9.11** Najděte lokální maxima a minima funkcí

(a)  $f(x, y) = e^{1+x^2-y^2}$ ,

(b)  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 - 3x_1x_2 + 4x_2x_3 + 6x_3^2$ ,

(c)  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_3 + x_1^2 - x_2 + x_2x_3 + x_2^2 + 3x_3^2$ .



Na následujícím příkladě si ukážeme *metodu nejmenších čtverců* (the least squares method). Ta se používá hlavně ve statistice při regresní analýze, což je jedna z nejpoužívanějších (ne-li nejpoužívanější) metoda analyzování dat.

**Cvičení 9.12** Představme si, že máme program, který nějakým způsobem zpracovává text. Z teoretické analýzy víme, že délka běhu tohoto programu závisí na mnoha faktorech, ale v zásadě je úměrná délce vstupu: tzn. „skoro přesně platí“

$$t(n) = a + bn,$$

kde  $t(n)$  je délka běhu pro text délky  $n$  a  $a, b$  jsou neznámé parametry.

Po získání vstupu od uživatele byste chtěli vypsát hlášku: „Zpracování Vašeho textu bude trvat asi  $x$  vteřin.“, jak co nejlépe odhadnout hodnotu  $x$ ?



**Cvičení 9.13** Uvažujme funkci  $f(x, y) = x^3 + xy + y^2$ .

Proveďte, zda je v následujících bodech lokální extrém funkce  $f$ :

a)  $(0, 0)$ ;

b)  $(-2, 6)$ ;

c)  $(0, 5)$ ;

d)  $(\frac{1}{6}, -\frac{1}{12})$ .



## Řešení

**Řešení Cvičení 8.3:** (a)  $(0, 0)$ , (b)  $(0, 0, 0)$ , (c)  $(0, 0)$ , (d)  $(0, 0)$ , (e)  $(0, 0)$  a body na kružnicích  $x^2 + y^2 = k\pi + \pi/2, k \in \mathbb{N}$


**Řešení Cvičení 8.4:** (a)  $f(0, 0) = 1$  díky známe limitě  $\lim_{r \rightarrow 0} \sin r/r = 1$ , (b) na kružnicích, jejichž poloměr splňuje  $\pi r = \tan(\pi r)$

**Řešení Cvičení 9.3:** (a) matice  $[2y^2, 4xy \mid 4xy, 2x^2]$ , (b) matice  $[e^{-(x+y)}, e^{-(x+y)} \mid e^{-(x+y)}, e^{-(x+y)}]$ , (c) diagonální matice  $\text{diag}(2, 6y, 12z^2)$ .

**Řešení Cvičení 9.5:** pro  $A > 0$  a  $AC - B^2 > 0$  se jedná o ostré minimum, pro  $A < 0$  a  $AC - B^2 > 0$  o maximum a pro  $AC - B^2 < 0$  ani o jedno

**Řešení Cvičení 9.6:** (a) bod  $(0, 0)$  je jediný krit. bod, ale není ani maximem ani minimem, je to sedlový bod, (b) bod  $(0, 0)$  je jediný krit. bod a jedná se o minimum

Řešení Cvičení 9.7:  $(0, 0)$  je sedlo,  $(\sqrt{2}, 0)$ ,  $(-\sqrt{2}, 0)$  jsou lok. maxima a  $(0, \sqrt{2})$ ,  $(0, -\sqrt{2})$  lok. minima



Řešení Cvičení 9.8:  $(6/11, 18/11, -6/11)$

Řešení Cvičení 9.9:  $(1/2, 1, \sqrt{5}/2)$ ,  $(1/2, 1, -\sqrt{5}/2)$

Řešení Cvičení 9.10: musí mít co nejmenší povrch, tedy  $8 \times 8 \times 4$  cm

Řešení Cvičení 9.11: (a) jediný krit. bod je  $(0, 0)$  ale není ani max. ani min, (b) jediný krit. bod je  $(0, 0, 0)$ , je to lok. minimum, (c) jediný krit. bod je  $(1/20, 11/20, -2/20)$ , je to lok. minimum

## ChangeLog

Verze	Datum	Autor	Log
1.02	9.10.24	ŠS	Oprava v postačující podmínce - bod extrému místo extrému.
1.01	27.9.21	SS	Přidán příklad 13.
1.0	15.11.18	ŠS	Verze z roku 2017/2018.