

NI-MPI přednáška 6

Analýza: integrály – příklady

Štěpán Starosta

23. 10. 2023

FIT ČVUT

Věta

Bud' $f(x, y)$ integrabilní funkce na $D = [a, b] \times [c, d]$. Pokud existuje jeden z integrálů

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \quad \text{nebo} \quad \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

potom je roven dvojnému integrálu

$$\iint_D f(x, y) dx dy.$$

Příklad 1: obdélníková oblast

Základní cvičení 12.1

Bud' $f(x, y) = \frac{x^2}{1+y^2}$ a $D = [2, 3] \times [0, 3]$. Spočítejte

$$\int_D f(x, y) dx dy.$$

Příklad 1: obdélníková oblast

Základní cvičení 12.1



Bud' $f(x, y) = \frac{x^2}{1+y^2}$ a $D = [2, 3] \times [0, 3]$. Spočítejte

$$\int_D f(x, y) dx dy.$$

Připomenutí: téměř obecná oblast i

Budeme uvažovat dva typy oblastí:

- (typ 1) x je z intervalu $[a, b]$ a y je omezené spoj. funkcemi $\varphi_1(x)$ a $\varphi_2(x)$ splňujícími $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$ pro všechna $x \in [a, b]$,
- (typ 2) y je z intervalu $[c, d]$ a x je omezené spoj. funkcemi $\psi_1(y)$ a $\psi_2(y)$ splňujícími $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$ pro všechna $y \in [c, d]$.



Připomenutí: téměř obecná oblast ii

A integrály přes takovéto oblasti budeme počítat dle následující věty.

Věta

Pokud integrály (ve vzorcích níže) existují, platí pro oblast D , že

- *je-li D typu 1, máme*

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

- *je-li D typu 2, máme*

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

Příklad 2: obecnější oblast i

Základní cvičení 13.1

Bud' $f(x, y) = xy$. Spočítejte

$$\int_D f(x, y) dx dy,$$

kde D je omezená množina ohraničená křivkami $y^2 = x$ a $y = x - 2$.

Příklad 2: obecnější oblast ii

$$\int_D xy = \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy dx \right) dy$$

Připomenutí: substituce i

Mějme $\Psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\Psi(\mathbf{v}) = (\Psi_1(\mathbf{v}), \dots, \Psi_n(\mathbf{v}))$. **Jacobiho matice** funkce Ψ je následující zobrazení $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n,n}$ (pro $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$)

$$J_{\Psi} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Psi_1}{\partial v_1} & \dots & \frac{\partial \Psi_1}{\partial v_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \Psi_n}{\partial v_1} & \dots & \frac{\partial \Psi_n}{\partial v_n} \end{pmatrix},$$

pokud všechny parciální derivace existují.

Věta (Věta o substituci)

Nechť D je omezená uzavřená množina na \mathbb{R}^n . Nechť $\Psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ má spojité všechny parciální derivace (všech složek) na nějaké otevřené nadmnožině množiny D a skoro všude na D platí, že

- 1 Ψ je bijekce a
- 2 $\det J_\Psi$ je nenulový.

Potom pro každou spojitou funkci $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ platí

$$\int_{\Psi(D)} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_D f(\Psi(\mathbf{v})) |\det J_\Psi(\mathbf{v})| d\mathbf{v}$$

kde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Příklad 3: obecnější oblast i

Základní cvičení 14.1

Bud' $f(x, y) = 3x + 2y - 1$. Spočítejte

$$\int_{\tilde{D}} f(x, y) dx dy,$$

kde $\tilde{D} = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \text{ a } x \leq y\}$.

\tilde{D}

$$\Psi(D) = \tilde{D}$$

$$\Psi : \begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$$

$$\Psi \left(\begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix} \right)$$

$$J_{\Psi} \left(\begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix} \right)$$

Příklad 3: obecnější oblast ii

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \Psi(\mathbf{v})$$

$$\Psi^{-1}(\tilde{D}) = D = [1, 2] \times \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$$

$$J_{\Psi} \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -r \sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & r \cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

$$\det J_{\Psi} \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} =$$

$$\int_D (3x + 2y - 1) dx dy =$$

Příklad 3: obecnější oblast iii

$$\int_{\tilde{D}} (3x + 2y - 1) dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \left(\int_1^2 (3r \cos \varphi + 2r \sin \varphi - 1) |r| dr \right) d\varphi =$$

Doplnění k větě o postupném integrování i

Mějme $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

Uvažme funkci

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{pokud } x = \frac{1}{2} \text{ a } y = \frac{\ell}{2^i} \text{ pro všechna kladná celá } \ell, i; \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

$\iint_D f(x, y) dx dy$ existuje (a je roven 0), ale $\int_0^1 f\left(\frac{1}{2}, y\right) dy$ neexistuje.

Doplnění k větě o postupném integrování ii

Mějme $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

$$\text{Mějme } \tau(t) = \begin{cases} 1 & \text{pro } t \in [0, \frac{1}{2}]; \\ 0 & \text{pro } t \in (\frac{1}{2}, 1], \end{cases}$$

a

$$g(x, y) = \begin{cases} \tau(x) & \text{pokud } y = \frac{\ell}{2^i} \text{ pro všechna kladná celá } \ell, i; \\ 1 - \tau(x) & \text{jinak.} \end{cases}$$

$\iint_D g(x, y) dx dy$ neexistuje, ale $\int_0^1 g(x, y) dx$ existuje a navíc je roven $\frac{1}{2}$, a tedy $\int_0^1 \left(\int_0^1 g(x, y) dx \right) dy$ existuje.